

 Fiche Instruction	Créé le 29/03/2016 : SYLVIE CLAIREAUX	Validé le 22/04/2016 : SYLVIE CLAIREAUX	Approuvé le 22/04/2016 YVES EGRIX
	C1-INS06 - Version 2 Seul le document informatique fait foi. Preconisation pour un scotch test <small>Date de mise en application : 22/04/2016 Dernière modification le 27/03/2020 par SYLVIE CLAIREAUX Doit être révisé pour le 22/04/2022</small>		



Laboratoire du Centre Hospitalier François Dunan Tél : 41.14.05

Préconisations pour un scotch-test

- Le prélèvement doit être effectué au lever, avant la toilette et les premières selles.
- Utiliser un scotch transparent, le scotch translucide ne convient pas.
- Appliquer le côté adhésif sur les plis de la marge anale et le maintenir en appuyant quelques secondes.
- Retirer le scotch et l'étaler sur la lame support fournie par le laboratoire.
- Renouveler l'opération avec le second scotch.
- Replacer les 2 lames dans l'étui fourni par le laboratoire.
- Identifier l'étui avec votre nom, prénom et date de naissance.
- Acheminer le prélèvement au laboratoire à température ambiante (18-25 °C) dans les plus brefs délais.

Demande de renseignements

- Nom de naissance :
- Nom d'usage :
- Prénom :
- Sexe :
- Date de naissance :
- Date de recueil :
- Heure de recueil :
- Avez-vous effectué le prélèvement avant toute toilette ? oui non
- Présentez-vous : des démangeaisons anales? oui non
des insomnies ? oui non
- Autres renseignements :
-